

ЗВІТ
про НДР кафедри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів
Полтавського державного медичного університету
за III й квартал 2025 року

<i>№ n/n</i>	<i>Назва кафедри</i>	<i>Найменування завдання, виконавець</i>	<i>Термін виконання завдання</i>	<i>Наукові результати виконання завдання</i>
1	2	3	4	5
1	Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів	Ініціативна НДР Полтавський державний медичний університет: «Особливості реабілітації ортодонтичних пацієнтів різного віку», державний реєстраційний номер 0122U201229	01.2023-12.2028	Надруковані: Статті – 4 (Scopus – 4)

<i>Найменування завдання</i>	<i>Найменування показників, виконання завдання (стаття, патент, інформаційний лист, метод.рекомендації, нововведення, конференції, програма)</i>	<i>Одиниця виміру</i>	<i>Очікувані результати</i>	<i>Фактично досягнуто</i>
1	2	3	4	5
Метою даного дослідження було визначення поширеності патології прикусу та потреби в ортодонтичному лікуванні дітей та підлітків із депривацією слуху за допомогою	Стаття Sokolohorska-Nykina Yu.K., Kuroiedova V.D., Stasiuk O.A., Vyzhenko Ye.Ye., Halych L.B. Prevalence of malocclusion in school children with hearing deprivation and the need for orthodontic treatment. Stomatological Bulletin. 2025;1(130):122-130. DOI https://doi.org/10.35220/2078-8916-2025-55-1.18 (<i>Scopus, англ</i>)	10	ЗІЩА поширені серед літей з ДВС	Патологія прикусу серед глухих дітей та підлітків має високі показники. Аналіз сагітального співвідношення неправильного прикусу виявив поширеність 73,77% для класу I, 26,23% для класу II. Аналіз вертикального співвідношення показав, що 42,62% глухих дітей мали глибокий прикус.

DAI (Dental Aesthetic Index)				73.76% обстежених нами глухих дітей та підлітків мали оцінку DAI ≥ 26 , тому потребували того чи іншого ортодонтичного лікування
Вивчення зв'язку положення голови, шийного відділу хребта у пацієнтів з різними типами зубощелепних аномалій	Стаття Stasiuk O.A., Vyzhenko Ye.Ye., Kuroiedova V.D., Sokolohorska-Nykina Yu.K., Halych L.B. Relationship between craniocervical structures in patients with malocclusion. Journal of International Dental and Medical Research. 2025;2(18):771-779. (<i>Scopus, англ</i>)	10	Є зв'язок ЗЩА з положенням голови та шийного відділу хребта	Встановлена достовірна різниця кута CVA між пацієнтами з I та II класом ($p=0.035$), різниця кута SN-OPT між пацієнтами II та III класу ($p=0.048$) та різниця кута SN-VR між пацієнтами I та III класу ($p=0.005$) та між пацієнтами II та III класу ($p<0.001$). Висновки. Встановлено значущі зв'язки між положенням голови, шийного відділу хребта з зубощелепними аномаліями. Для скелетного класу II характерний нахил голови до задуг, III клас пов'язаний з нахилом голови до передуг та до низу.
Виявити співзалежність між біометричними та фотометричними особливостями профілю обличчя у пацієнтів із дистальним прикусом з різними типами росту нижньої щелепи в пізньому періоді змінного прикусу.	Стаття Halych LB, Halych LV, Kuroiedova VD. Correlation of biometric and photometric features of the facial profile in distal occlusion. East Ukr Med J. 2025;13(2):482-489 DOI: https://doi.org/10.21272/eumj.2025;13(2):482-489 (<i>Scopus, англ</i>)	10	Є співзалежність між біометричними та фотометричними особливостями профілю обличчя у пацієнтів із дистальним прикусом	всіх пацієнтів з дистальним прикусом співзалежність між біометричними та фотометричними особливостями профілю обличчя складає 100%. При аналізі впливу морфометричних параметрів на естетичні показники профілю обличчя найбільша кількість сильних та середніх зв'язків встановлена при нейтральному типі росту нижньої щелепи (4 сильних та 7 середніх) та нейтрально-

				горизонтальному (1 сильний та 12 середніх). Морфометричні показники, які вивчались, істотно впливають на значення кута gl-Ul-pg, кута V (Viazis), кута Thme/NoV та профільного кута.
Оцінити висоту та товщину альвеолярної кістки в ділянці центральних різців щелеп у ортодонтичних українських пацієнтів за допомогою конусно-променевої комп'ютерної томографії.	Стаття Vyzhenko YY, Kuroiedova VD, Halych LB, Stasiuk OA, Sokolohorska-Nykina YK. Morphological analysis of the alveolar bone in the frontal area of the jaws with malocclusion, evaluated by cone-beam computed tomography. Rep. of Morph. 2025;31(2):65-73. DOI: https://doi.org/10.31393/morphology-journal-2025-31(2)-08 (Scopus, англ)	10	Є зв'язок між товщиною альвеолярної кістки в ділянці центральних різців щелеп та різними класами ЗЩА	Товщина альвеолярної кістки в ділянці верхівок коренів нижніх центральних різців у пацієнтів із II класом більша з вестибулярного боку, ніж з орального; при III класі, навпаки, вона була більшою з орального боку, що слід враховувати при плануванні ортодонтичного лікування.

Зав. кафедри післядипломної освіти
лікарів-ортодонтів ПДМУ
д.мед.н.,професор

Віра КУРОЄДОВА

Відповідальний за наукову роботу
кафедри к.мед.н., доцент

Євгеній ВИЖЕНКО